Lerasept® VET COC

Premium Breitband-Desinfektionsmittel auf Basis von Chlorkresol und Ameisensäure

Lerasept® VET COC ist ein Flächendesinfektionsmittel - Konzentrat für die sichere Bekämpfung von Dauer- und Entwicklungsformen von Endoparasiten wie Kokzidien, Kryptosporidien und Giardien, sowie aller parasitischen Rundwürmer und deren Eier und Larven. Lerasept® VET COC wird bei der Parasiten- und Mikrobenbekämpfung in Tierställen, Stalleinrichtungen, Tierheimen sowie bei Transportfahrzeugen erfolgreich eingesetzt. Dank seiner speziellen Wirkstoffkombination zeigt das Produkt auch eine hervorragende bakterizide und viruzide Wirkung wie z.B. gegen Influenza virus H5N2.

Materialverträglichkeit

Die Anwendungslösung ist geeignet für alle säurebeständigen Materialien.
Bei allen anderen Werkstoffen sind Vorversuche an geeigneten Stellen durchzuführen.

Anwendung

Lerasept® VET COC ist mit Sprühlanzen, Sprühanlagen, Handspritzen oder auch Schaumgeräten einsetzbar. Die zu behandelnden Flächen müssen gut gereinigt und möglichst trocken sein.
Einsatzmenge: 400 ml/m^2

Gutachten nach DIN EN 1656, 1657, 14204, 14349, 14675, 16438, 17122 und DVG-Richtlinien liegen vor.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Biozid-Registrierung


Deutschland	BAuA: N-80828
Österreich	registriert
Polen	8082/20
Frankreich	N°Inventaire: 78333
Schweiz	CHZN7345
Dänemark	PR 4549907
Slowakei	bio/1527/D/24/CCHLP
Ungarn	NNGYK/29278/2024
Republik Moldau	P-0214/2025

Wichtige Inhaltsstoffe

Chlorkresol (250 g/kg), Ameisensäure (57 g/kg), Tenside, Lösungs-vermittler

Wir beraten Sie gerne!

Kontakt Biocides
biocides@stockmeier.com
+49 521 / 3037- 0



Kategorie

- Biozid

pH-Wert

- Sauer

Aktivsubstanz

- Chlorkresol
- Ameisensäure

Wirksamkeit

- Bakterizid
- Viruzid
- Gegen parasitäre Würmer
- Gegen Kokzidien
- Tuberkulozidie

Aggregatzustand

- Flüssigkeit

Konformität

- IHO
- DVG

Zertifizierungen

- Halal

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 18.02.2026, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG
Am Stadtholz 37
Bielefeld
www.stockmeier.com

Lerasept® VET COC

Spezifikationen

Merkmal	Spezifikation
Aussehen	klare, gelbliche Flüssigkeit
Dichte (20°C)	1,070 - 1,100 g/ml
Leitfähigkeit (1%ige Lösung)	2,05 - 3,05 mS/cm
pH-Wert (1%ige Lösung)	1,7 - 2,3

Abwasserverhalten

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung und Einhaltung eventuell gegebener örtlicher Vorschriften sind uns keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt bekannt geworden.

Lagerhinweise

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost- und Hitzeeinwirkung schützen.
Evtl. zu viel entnommenes Produkt darf niemals in das Originalgebinde zurückgefüllt werden.

Erste Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.
Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Nach Hautkontakt: Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.

Wirksamkeiten

Keim	Temperatur	Zeit	Verunreinigung	Anwendung
Desinfektion von Oberflächen durch Sprühen (PT3)				
Kokzidien, Oozysten, Ascaris suum (Würmer/Eier)	20°C	120 Min.	gering	2% Produkt ≙ 200 ml auf 10 l Wasser verdünnen
Bakterien	10°C	30 Min.	gering	0,5% Produkt ≙ 50 ml auf 10 l Wasser verdünnen
Mycobakterien	10°C	60 Min.	gering	0,75% Produkt ≙ 75 ml auf 10 l Wasser verdünnen
Pilze (Aspergillus brasiliensis, Aspergillus fumigatus)	10°C	60 Min.	gering	1,25% Produkt ≙ 125 ml auf 10 l Wasser verdünnen
Influenza Virus H5N2	10°C	30 Min.	gering	1% Produkt ≙ 100 ml auf 10 l Wasser verdünnen
Viren	10°C	30 Min.	gering	2% Produkt ≙ 200 ml auf 10 l Wasser verdünnen

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 18.02.2026, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG
Am Stadtholz 37
Bielefeld
www.stockmeier.com