Lerasept® Viroxx S

Leistungsstarkes Tränkwasser- und Flächendesinfektionsmittel

Lerasept® Viroxx S ist ein pulverförmiges vielseitig einsetzbares Desinfektionsmittel auf Basis von Tensiden, oxidierenden organischen und anorganischen Säuren inklusive Farbindikator. Es wird zur kontinuierlichen Tränkwasserdesinfektion in belegten Ställen, sowie zur Stoßdesinfektion von Tränkwassersystemen eingesetzt. Außerdem kann es zur Desinfektion von Stallungen, Geräten und Fütterungsanlagen sowie Fahrzeugen, Stiefeln und Reifen verwendet werden.

Materialverträglichkeit

Eignet sich zum Einsatz auf allen für die Landwirtschaft üblichen Metall- und Kunststoffoberflächen.
Bei allen anderen Werkstoffen sind Vorversuche an geeigneten Stellen durchzuführen.

Anwendung

1. Grunddesinfektion Tränkwassersysteme (PT4) :

Nach erfolgter Reinigung Leitungssystem mit 1%iger (100 g auf 10 l Wasser) Lerasept® Viroxx S-Lösung befüllen und 60 Minuten wirken lassen. Danach ablassen und mit Wasser nachspülen. Für Druckausgleich sorgen.

2. Tränkwasserdesinfektion (PT5):

Im belegten Tierställen kontinuierlich 0,1 % (1 g/l Wasser) Lerasept® Viroxx S in die Tränkleitungen dosieren. Bereiten Sie eine 10%ige (100 g/l Wasser) Lerasept® Viroxx S-Lösung in einem Vorratsbehälter vor. Dosieren Sie 1 % dieser Lösung mit einem Dosiergerät in das System, um eine Endkonzentration von 0,1 % Lerasept® Viroxx S im Wasser zu erreichen.

3. Routinedesinfektion von Stallungen/ Gerätschaften (PT3):

Sprühen oder schäumen Sie eine 1%ige Lerasept® Viroxx S Lösung gleichmäßig auf die gereinigten nicht porösen Oberflächen und Geräte auf.

4. Desinfektion von Tiertransportern (PT3):

Sprühen Sie die Außenseite des Fahrzeugs mit einer 2%igen Lerasept® Viroxx S Lösung ein (200 g in 10 l Wasser verdünnen). Verwenden Sie für die Innenseite der Fahrzeuge eine 3%ige Lösung.

5. Wasserdesinfektion in Aquakulturen (PT3):

Das Wasser wird mit Lerasept® Viroxx S in Abwesenheit von Fischen desinfiziert. Entweder wenn keine Fische vorhanden sind, wie in unbesetzten Becken oder in einer separaten Desinfektionseinheit (z. B. in rezirkulierenden Aquakultursystemen). Fügen Sie Lerasept® Viroxx S hinzu, bis die gewünschte Endkonzentration (0,1 % für Bakterien, 0,5 % für Viren) erreicht ist. Lassen Sie das Mittel 30 Minuten (Bakterien) oder 120 Minuten (Viren) einwirken. Vergewissern Sie sich, dass die Desinfektion abgeschlossen ist, bevor das Wasser mit Fischen in Kontakt kommt.

6. Desinfektion von Wasser für die Pflanzenbewässerung in Gewächshäusern (PT2):

Verwenden Sie eine Dosiervorrichtung, um eine Endkonzentration von 0,1 % Lerasept® Viroxx S im Wasser zu erreichen.


7. Desinfektion von Rohrleitungen in Bewässerungsystemen & Aquakulturen (PT4):

Nach der Reinigung die Rohrsystem mit einer 0,2%igen Lösung (20 g auf 10 l Wasser verdünnen) Lerasept® Viroxx S füllen, bis eine leicht rosa Färbung sichtbar ist. 30 Minu-

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 18.02.2026, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Wir beraten Sie gerne!

Kontakt Biocides
biocides@stockmeier.com
+49 521 / 3037- 0



Kategorie

- Biozid

Aktivsubstanz

- Persäure

Wirksamkeit

- Bakterizid
- Levurozid
- Viruzid

Aggregatzustand

- Pulver

Konformität

- IHO

Zertifizierungen

- Halal

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG
Am Stadtholz 37
Bielefeld
www.stockmeier.com

Lerasept® Viroxx S

ten einwirken lassen. Bei Viren 0,5% und 120 Minuten verwenden. Anschließend ablassen und mit Wasser spülen. Druckentlastung sicherstellen.

Gutachten nach DIN EN 1276, EN 1656, EN 1657, EN 13697, EN 14349, EN 14476, EN 14675, EN 16437, EN 16438 und EN 17122 liegen vor.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Biozid-Registrierung

Deutschland	BAuA: N-87607
Österreich	registriert
Polen	9468/23
Slovakei	bio/2831/D/23/CCHLP
Frankreich	N°Inventaire: 85478
Schweiz	CHZN7615
Republik Moldau	P-0213/2025
Dänemark	PR nr. 4609682
Litauen	Nr. PNO4882
Spanien	Für PT2 Anwendung reg. Nr.: 25-20-1275
Spanien	Für PT4 Anwendung reg. Nr.: 25-20-1275-HA

Wichtige Inhaltsstoffe

Pentakalium-bis(peroxomonosulfat)-bis(sulfat) (505 g/kg), organische und anorganische Säuren, Phosphate, Tenside

Spezifikationen

Merkmal	Spezifikation
Aussehen	leicht rosa Pulver
pH-Wert (2%ige Lösung)	1,5 - 2,1
Wasserstoffperoxid-Gehalt	min. 2,27 Gew.%

Abwasserverhalten

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung und Einhaltung eventuell gegebener örtlicher Vorschriften sind uns keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt bekannt geworden.

Lagerhinweise

Staubbildung vermeiden. In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost- und Hitzeeinwirkung schützen. Eventuell zu viel entnommenes Produkt darf niemals in das Originalgebinde zurückgefüllt werden.

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 18.02.2026, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG
Am Stadtholz 37
Bielefeld
www.stockmeier.com

Lerasept® Viroxx S

Erste Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mindestens 48 Stunden nach einem Unfall. Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.
Nach Einatmen: Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Nach Einatmen von Produktstaub: Frischluftzufuhr und Arzt konsultieren.
Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Arzt konsultieren, wenn Reizung anhält. Sofort mit Wasser abwaschen.
Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken: Sofort Arzt aufsuchen. Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzüglich Arzt hinzuziehen. Kein Erbrechen auslösen. Viel Wasser zu trinken geben. Arzt rufen.

Wirksamkeiten

Keim	Temperatur	Zeit	Verunreinigung	Anwendung
1. Grunddesinfektion Tränkwassersysteme (PT5)				
Bakterien	20°C	60 Min.	gering	1% Produkt ≙ 100 g auf 100 l Wasser verdünnen
2. Tränkwasserdesinfektion (PT5):				
Bakterien	10°C	30 Min.	gering	0,1% Produkt ≙ 10 g auf 10 l Wasser verdünnen
3. Routinedesinfektion von Stallungen und Gerätschaften (PT3):				
Bakterien, Hefen	10°C	120 Min.	gering	1% Produkt ≙ 100 g auf 10 l Wasser verdünnen
unbehüllte Viren (Porcines Parvovirus, ECBO Virus)	10°C	120 Min.	gering	0,5% Produkt ≙ 50 g auf 10 l Wasser verdünnen
Influenza virus H5N2	10°C	5 Min.	gering	2% Produkt ≙ 200 g auf 10 l Wasser verdünnen
4. Desinfektion von Tiertransportern (PT3):				
Bakterien	10°C	5 Min.	gering	2% Produkt ≙ 200 g auf 10 l Wasser verdünnen
unbehüllte Viren (Porcines Parvovirus, ECBO Virus)	10°C	5 Min.	gering	3% Produkt ≙ 300 g auf 10 l Wasser verdünnen
5. Wasserdesinfektion in Aquakulturen (PT3):				
Bakterien	10°C	30 Min.	gering	0,1% Produkt ≙ 10 g auf 10 l Wasser verdünnen
Viren	10°C	120 Min.	gering	0,5% Produkt ≙ 50 g auf 10 l Wasser verdünnen
6. Desinfektion von Wasser für die Pflanzenbewässerung in Gewächshäusern (PT2):				
Bakterien	20°C	60 Min.	gering	0,1% Produkt ≙ 10 g auf 10 l Wasser verdünnen
Algen	20°C	60 Min.	gering	0,5% Produkt ≙ 50 g auf 10 l Wasser verdünnen
7. Desinfektion von Rohrleitungen in Bewässerungsystemen & Aquakulturen (PT4):				
Bakterien	10°C	30 Min.	gering	0,2% Produkt ≙ 20 g auf 10 l Wasser verdünnen
unbehüllte Viren (Porcines Parvovirus, ECBO Virus)	10°C	120 Min.	gering	0,5% Produkt ≙ 50 g auf 10 l Wasser verdünnen

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 18.02.2026, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG
Am Stadtholz 37
Bielefeld
www.stockmeier.com